


# Meie puravikke 6



FOTOD: VELLO LIIV



## PÖÖGIPURAVIK

*Leccinum pseudoscabrum*  
Sünonüüm *L. carpini*

Kübar hele oliivjasbeež kuni -pruun, noorena tumedam, sile või kohati muhklik, läikiv, läbimõõt kuni 14 cm. Torukesed heledad, oliivjad või kollakaskreemid, poorid sama värvi, väikesed, katsumisel muutuvad tumedaks kuni mustjaks.



Jalg valkjalt põhjal kaetud mustjate soomustega, silindriline või alusel jämenev, kuni 14 x 3,5 cm. Seeneliha helekremikas, lõikel muutub kahvatu-lillakashalliks, seejärel mustjaks. Eospulber oliivjaspruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 14,5–19 x 4,5–6,5 µm.

Puisniitudel, kasvab koos tamme, sarapuude või pöökidega, harva. VIII–IX. Söödav värskelt.

Sarnane liik: kasepuravik.

**VALGE PURAVIK***Leccinum holopus*

Kübar valkjas, vanemalt servast määrdunud-hallikasroheline, limane, viltjas, läbimõõt kuni 10 cm. Torukesed hallikasvalged, kuni 12 mm pikad; poorid sama värvi, muutuvad aeglaselt halliks, väikesed, ümarad. Jalg valge, allotsas vanalt rohekate plekidega, valkjaspruunikate kiudsoomustega, kuni 15 x 2 cm. Seeneliha valkjashall, jala alusel rohekas, vesine. Eospulber helepruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 11–15 x 4–6 µm.

Niisketes ja märgades leht- ja segametsades, sooservadel, sookaskede all, väga sageli, kohati hulgaliselt. VI–XI. Söödav värskelt.

Sarnane liik: kasepuravik.

**Leccinum roseotinctum**

Kübar valkjas, korallroosaka varjundiga, kohati ookerpruunikate liibunud soomustega, kumer, läbimõõt kuni 15 cm. Torukesed kollakasvalged; poorid sama värvi, katsumisel muutuvad hele-korallpunakaks. Jalg valge, soomused valged või heleookerjad, puhetunud, kuni 15 x 3 cm. Seeneliha valge, tihke, lõikel muutub algul korallpunakaks, seejärel lillakashalliks, laiguti ka sinakaks. Eospulber kreemikaspruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 12–18 x 4,5–6 µm.

Kasvab segametsades, seotud kasega, harva. VII–IX. Söödav värskelt.

Sarnane liik: kasepuravik.

**KAHVATU KASEPURAVIK***Leccinum scabrum* var. *avellaneum*

Kübar helekreemikas või ookerjas, kumer, hiljem lame, viltjas, läbimõõt kuni 14 cm. Torukesed helekreemikad, hiljem kahvatuhallikad, pikad, kuni 20 mm; poorid sama värvi, muljumisel muutuvad ookerjaks kuni pruunikaks. Jalg kübaravärvi, alusel heledam, soomused heleookerjad, tugevalt nuijas, kuni 16 x 3,5 cm. Seeneliha lõikel jäävalt valge. Eospulber pruunikas. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 13–18,5 x 4,5–5,5 µm.

Kasvab segametsades, seotud kasega, harva. VIII. Söödav värskelt.

Mõned autorid on käsitletud ka omaette liigina.



	kupatatult söödav		mürgine
	söödav		surmavalt mürgine
	tinglikult söödav		värskelt mürgine, kupatatult söödav
	mittesöödav		mürgisus kaheldav
	Eesti punases raamatus ja/või riikliku looduskaitse all		

Loe veel:

